

Vitamin E (dl-alpha tocopheryl acetate)

Datum štampanja: 15.12.2023

Avena Lab
Farmadria d.o.o. Since 1991.

POSEBNA UPOZORENJA

BEZBEDNOSNE MERE



Oprema za ličnu zaštitu: prilikom upotrebe uvek nositi propisanu opremu za ličnu zaštitu!

Zaštita ruku: Kod normalne upotrebe nije potrebna. Kod dugotrajnije izloženosti koristiti zaštitne rukavice (SRPS EN 374-2:2016).

Zaštita očiju: Kod normalne upotrebe nije potrebna. Ukoliko postoji opasnost od prskanja u oči, koristiti zaštitne naočare sa bočnom zaštitom (SRPS EN ISO 16321-1:2022).

Zaštita kože: Kod normalne upotrebe nije potrebna. Kod dugotrajnije izloženosti koristiti zaštitnu radnu odeću. Pamučno zaštitno odelo i zatvorena obuća (SRPS EN ISO 20345:2022).

Zaštita disajnih organa: Prilikom normalne upotrebe i odgovarajućoj provetrenosti nije potrebno.

Skladištenje: Čuvati na hladnom, suvom i dobro provetrenom mestu. Držati dalje od hrane, pića i stočne hrane.



Higijenske mere: Voditi računa o ličnoj higijeni – prati ruke pre odmora i posle rukovanja. Izbegavati dodir sa očima, kožom i odećom. Nemojte jesti, piti ili pušiti dok radite. Ne udisati pare / aerosol.

POSTUPCI U SLUČAJU NESREĆE

Postupak čišćenja: Proizvod upiti odgovarajućim materijalima (inertnim materijama) odložiti u posebne posude i ukloniti u skladu sa važećim propisima o postupanju sa otpadom. Provetriti prostor. Zagađeno područje očistiti obilnom količinom vode.

Odgovarajuće sredstvo za gašenje: Sredstva za gašenje izabrati prema uslovima u okolini.

Upozoriti i druge osobe!: Pogledati: Lokalni plan protivpožarne zaštite



Pružite prvu pomoć!

Zaštite sebe. Nemojte udisati gas/dim/isparenja/izmaglice.

Posle nezgode sačekajte da nadređeni ili vatrogasci dozvole ponovni pristup radnom mestu.



Obavestiti nadređene!

SIMPTOMI TROVANJA

Posle udisanja: Prekomerna izloženost aerosolima ili pari može izazvati iritaciju disajnih puteva.

Posle dodira sa kožom: U kontaktu s kožom može izazvati iritaciju (crvenilo, svrab).

Posle dodira s očima: U dodiru sa očima može izazvati iritaciju (suzenje, crvenilo).

Posle gutanja: Može izazvati slabost/ povraćanje i proliv. Može izazvati bolove u stomaku.

OPIS MERA PRVE POMOĆI

Posle udisanja: Povređenog izneti na svež vazduh - napustiti (kontaminirano) zagađeno područje. Kod pojave i zadržavanja simptoma potražiti pomoć lekara.

Posle dodira sa kožom: Delove tela koji su došli u dodir s preparatom odmah oprati s puno vode i sapuna. Ako se stanje ne poboljša, potražiti medicinsku pomoć.

Posle dodira s očima: Otvorene oči, i ispod kapaka, odmah isprati s puno tekuće vode (nekoliko minuta). U slučaju pojave i zadržavanja simptoma potražiti pomoć lekara.

Posle gutanja: Ne izazivati povraćanje. Isprati usta vodom! Licu bez svesti ne stavljati ništa u usta. U slučaju nedoumice ili pojave slabosti, grčeva, odnosno drugih simptoma, potrebno je potražiti pomoć lekara. Lekaru pokazati bezbednosni list ili etiketu.

UKLOVANJE OTPADOM

Uklanjanje otpada: Sa otpadom postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon): predati ovlašćenom licu za sakupljanje, za uklanjanje i za preradu otpada (otpadnog materijala).

Uklanjanje otpadne ambalaže: Potpuno ispražnjenu ambalažu ukloniti u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Službeni glasnik 36/09 i 95/18-dr. zakon).

Prilikom odstranjivanja pridržavajte se i internih uputstava.